

# ÉPINÉPHRINE

Sympathomimétique



10 seringues par boîte  
Num. fournisseur : 600694



**AGUETTANT CANADA INC.**

Tél. : 514 772-6294 | Sans frais : 1 833 772-6294

Télex : 1 888 772-0380

injectables@aguettant.ca | www.aguettant.ca

# ÉPINÉPHRINE

(Sympathomimétique)

Prêt à l'emploi

Durée de conservation de 2 ans | Stérile et sécuritaire



Photos à titre d'illustration.

Sans conservateur  
Sans métabisulfite/sulfite

**CONCENTRATION :** Bitartrate d'épinéphrine (1 mg / 10 mL)

**VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie parentérale


**FORME POSOLOGIQUE :** La solution de 0,1 mg / mL contient 0,1 mg d'épinéphrine (sous forme de bitartrate d'épinéphrine) dans de l'eau pour injection et 9 mg de chlorure de sodium

**INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :** Peut contenir de l'hydroxyde de sodium et/ou de l'acide chlorhydrique pour ajuster le pH entre 3.0 et 3.4.

**ENTREPOSAGE :** Conserver entre 15-25°C. Conserver la seringue dans son emballage métallisé. Protéger de la lumière, de l'oxygène, du gel et de la chaleur excessive.

**INSTRUCTIONS DE MANIPULATION :** Conserver le produit dans l'emballage d'aluminium jusqu'au moment de l'utiliser. Ne pas utiliser l'injection si elle est colorée ou si elle contient un précipité. **La surface externe de la seringue pré-remplie est stérile jusqu'à l'ouverture du blister.** Administrer que si la solution est claire et le sceau est intact. Jeter la partie non utilisée.


	CPDN #	McKesson #		CPDN #	McKesson #
ATROPINE 0,5 mg	901100	172345	LIDOCAINE 2% 5 mL	902375	179859
ATROPINE 1 mg	901117	171425	LIDOCAINE 2% 10 mL	902443	179832
EPINEPHRINE 1 mg	902696	172711			
LIDOCAINE 1% 10 mL	902429	179860	PHENYLEPHRINE 500 mcg	901186	103187




1. Tirer la languette du blister et retirer la seringue pré-remplie. **L'extérieur de la seringue est stérile.**




2. Le procédé de stérilisation peut causer une adhésion du piston à la seringue. Avant d'enlever le bouchon bleu, **pousser** sur le piston pour libérer ce dernier.




3. Dévisser le capuchon pour briser les sceaux.



4. Vérifier que le sceau du capuchon de la seringue est complètement enlevé. Sinon, replacer le capuchon et dévisser à nouveau.



5. Expulser l'air en enfonçant doucement le piston.



6. Connecter la seringue à l'unité appropriée.



## LISTE DE PRODUITS

Solutions pour injection en seringues pré-remplies

Médicament	Dosage /Vol	DIN	Durée de conservation
Atropine	0.5 mg / 5 mL	02426269	36 mois
Atropine	1 mg / 5 mL	02426277	36 mois
Épinéphrine	1 mg / 10 mL	02521148	24 mois
Lidocaïne 1%	100 mg / 10 mL	02500647	36 mois
Lidocaïne 2%	100 mg / 5 mL	02522268	36 mois
Lidocaïne 2%	200 mg / 10 mL	02500655	36 mois
Phényléphrine	500 mcg / 10 mL	02454599	36 mois